

Nafarin 0,1% sprej za nos

DEKONGESTIV (VAZOKONSTRINGENS)

Sastav:

1 g 0,1 postotne izotonične otopine spreja sadržava 1 mg nafazolinklorida.

Pomoćne tvari:

Voda, pročišćena; natrijev klorid; dinatrijev edetat; benzalkonijev klorid.

Djelovanje i indikacije:

Nafazolin je simpatomimetik koji u lokalnoj primjeni na sluznici nosa izaziva intenzivnu i dugotrajnu vazokonstrikciju te time dekongestivno djeluje na hiperemičnu i edemičnu sluznicu. Djelovanje nastupa brzo, unutar 5 minuta od uštrcavanja u nos, smanjenjem otečenosti sluznice nosa i nosnog otpora, povećanjem protoka zraka kroz nosnice, olakšanom drenažom sinusa i otklanjanjem osjećaja začepljenosti. Učinak traje 4 - 6 sati. Sprej se rabi za simptomatsko liječenje rinitisa i sinusitisa, epistaksu, kod akutne i kronične hunjavice i pripreme za rinološke preglede.

Doziranje i način primjene:

Sprej je u navedenoj koncentraciji za odrasle.

Nastavak za nos stavite u nosnicu.

Pumpicu pritisnite 1 puta i pri tome lagano udahnite kroz nos. Po potrebi uštrcajte 3 – 4 puta dnevno jedno raspršivanje u svaku nosnicu.

Ne uzimajte dvostruku dozu lijeka ukoliko ste zaboravili prijašnju dozu.

Pripravak ne koristite češće nego što je preporučeno.



MJERE OPREZA

Primjena spreja ne smije trajati duže od 5 dana. Ako je potrebno duže liječenje može se nastaviti poslije 3 - 5 dana pauze uz savjet liječnika.

Interakcije:

Istovremena primjena velikih doza nafazolina s tricikličkim antidepresivima i maprotilinom, inhibitorima monoamino oksidaze (MAO), dovodi do povišenja krvnog tlaka.

Oprezno ga dajemo kod bolesnika s pojačanim radom štitnjače, bolestima srca, povišenim krvnim tlakom, šećernom bolesti i hipertrofijom prostate.

Trudnoća i dojenje:

Nije poznato da bi primjena nafazolina tijekom trudnoće bila štetna ili da bi se nafazolin izlučivao u majčino mlijeko. Zbog mogućnosti resorpcije i pojave sistemskih nuspojava potreban je oprez pri primjeni nafazolina tijekom trudnoće i dojenja.

Kontraindikacije:

Preosjetljivost na bilo koji sastojak lijeka, glaukom zatvorenoga kuta, suhi rinitis.

Nuspojave:

Nafazolin se uglavnom dobro podnosi i rijetko izaziva nuspojave. Kod primjene prevelikih doza ili prečeste lokalne primjene spreja može se pojaviti lokalni nadražaj sluznice nosa praćen bolnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće, reaktivna hiperemija (crvenilo i otok) sluznice nosa, atrofični rinitis i navikavanje. Sustavne nuspojave kod primjene nafazolina su glavobolja, povišeni krvni tlak, srčane aritmije, napetost, pospanost, bljedilo, mučnina, vrtoglavica, znojenje i osjećaj nemoći.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Način čuvanja:

Čuvati pri temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svjetlosti.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakovanje:

10 mL 0,1postotne izotonične otopine spreja za nos.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakovanju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
GALENSKI LABORATORIJ
Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute/ revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr