

Borvazelin

ACIDI BORICI UNGUENTUM

Sastav:

1 g masti sadržava 30 mg boratne kiseline.

Pomoćne tvari:

Vazelin, bijeli; glicerol.

Djelovanje i indikacije:

Boratna kiselina djeluje keratoplastički, blago antiseptički i antimikotički na gljivična oboljenja kože i sluznice. Borvazelin rabimo kod gljivičnih oboljenja kože i sluznice, te za njegu kože ruku.

Doziranje i način primjene:

Dva do tri puta dnevno u tankom sloju nanijeti na bolno mjesto i lagano umasirati.

MJERE OPREZA

Interakcije:

Nisu uočene.

Trudnoća i dojenje:

Prije uporabe potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Kontraindikacije:

Preosjetljivost na boratnu kiselinu.

Nuspojave:

Rijetko dolazi do reakcije preosjetljivosti.

U tom slučaju posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Način čuvanja:

Čuvati dobro zatvoreno pri temperaturi do 25 °C.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakovanje:

Tube po 25 g masti.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakovanju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute / revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr