

## Minoksidil otopina 5 %

### MINOXIDILI SOLTIO 5 %

#### ALOPECIK - LOSION KOJI POSPJEŠUJE RAST KOSE

##### Sastav:

1 mL 5 postotne otopine sadržava 50 mg minoksidila.

##### Pomoćne tvari:

Propilenglikol; etanol (96 postotni); voda, pročišćena.

##### Djelovanje i indikacije:

Otopina minoksidila primjenjuje se za liječenje tipične muške čelavosti (alopecia androgenetica) kod muškaraca u dobi od 18 do 65 godina starosti. Minoksidil širi krvne žile i poboljšava protok krvi kroz kožu vlasista. Na taj način poboljšava opskrbu hranjivim tvarima i pospješuje rast kose.

##### Doziranje i način primjene:

Ujutro i navečer nanijeti po 1 mL otopine na suhu kožu vlasista bez kose, te ju blago utrljati od središta prema rubovima tretiranog područja. Pritisnite na pumpicu 10 puta i dobit ćete 1 mL otopine. Ukupna dnevna doza ne smije biti veća od 2 mL. Ne koristiti sušilo radi bržeg isparavanja.

Nakon nanošenja otopine ruke treba temeljito oprati.

Učinak terapije vidljiv je nakon dva ili više mjeseci. Nakon što se postigne željeni učinak, nastaviti terapiju održavanja i nanositi po 1 mL otopine 1-2 puta tjedno.

Ukoliko nakon primjene od godinu dana nije zamjećen rast kose, treba prekinuti uporabu lijeka.

#### MJERE OPREZA

##### Upozorenje:

Ne smije doći u dodir s očima i sluznicom! Ukoliko dođe u kontakt sa sluznicom potrebno je ispiranje tekućom vodom!

Upotrijebiti samo na koži vlasista!

Otopina se koristi isključivo za vanjsku primjenu!

Kod muškaraca mlađih od 18 i starijih od 65 godina primjena se ne preporučuje!

##### Interakcije:

Istodobna primjena lokalnih kortikosteroida, tretinoina, ditranola ili vazelina može povećati apsorpciju minoksidila.

**Trudnoća i dojenje:**

Minoksidil nije namijenjen za primjenu u trudnoći i dojenju.

**Kontraindikacije:**

Preosjetljivost na bilo koji sastojak pripravka, povišen krvni tlak i srčane tegobe, kožne promjene na vlastištu (oštećena koža, psorijaza, opekom od sunca), istovremeno korištenje nekog drugog lijeka za lokalnu primjenu ili okluzivni zavoj, primjena kod djece i primjena kod pacijenata s obrijanom glavom.

Otopina nije namijenjena za primjenu kod žena!

**Nuspojave:**

Pojačana neželjena dlakovost izvan područja primjene, crvenilo i iritacija vlastišta, ubrzani rad srca, bol u grudima, sniženje krvnog tlaka, naglo povećanje tjelesne težine. U tim slučajevima treba prekinuti primjenu!

**Način čuvanja:**

Čuvati dobro zatvoreno pri temperaturi do 25 °C.

**Način izdavanja:**

Izdaje se bez liječničkog recepta.

**Pakovanje:**

100 mL 5 postotne otopine.

**Rok valjanosti:**

Otisnut na pakovanju.

**Galenski pripravak izradila:**

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute / revizija upute, veljača 2019.

**ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!**

[www.gljz.hr](http://www.gljz.hr)