

Nafazolin-borat kapi za oko

OFTALMIK (VAZOKONSTRINGENS)

Sastav:

1 g sterilne otopine sadržava: 0,5 mg nafazolinnitrata i 16,8 mg boratne kiseline.

Pomoćne tvari:

Voda za injekcije; natrijev tetraborat; dinatrijev edetat; benzalkonijev klorid.

Djelovanje i indikacije:

Nafazolin djeluje brzo i snažno vazokonstringentno, što se očituje u izravnoj lokalnoj primjeni na sluznicu. Djeluje kao simpatomimetik, dekongestiv.

Boratna kiselina djeluje blago bakteriostatski, virustatski i fungistatski. Kapi se rabe kao blagi antiseptik i antiflogistik, ublažavaju upalu, hiperemiju, sekreciju, oteklinu i bol. Upotrebljavaju se kod akutnog i kroničnog konjuktivitisa, akutne i kronične upale rožnice i različitih profesionalnih oboljenja oka.

Ublažavaju simptome nadraženosti oka uzrokovane prašinom, vjetrom, smogom, suncem, vlagom, plivanjem, dugotrajnim gledanjem televizije, prehladom i slično. Kapi se dobro podnose.

Doziranje i način primjene:

U terapijske svrhe ukapati 3–4 puta na dan 1–2 kapi u konjuktivalnu vrećicu oka. Djelovanje započinje unutar 10 minuta od primjene, a traje 2–6 sati. Preporučeno trajanje liječenja kod akutnih upala je 3–4 dana.

MJERE OPREZA

Oprez je potreban kod bolesnika s hipertenzijom, srčanim bolestima, bolestima štitne žlezde, kod bolesnika koji koriste MAO inhibitore, kod ozljeda ili infekcije oka.

Ne preporučuje se primjena kod nošenja mekih kontaktnih leća. Ne primjenjuje se kod djece do 6 godina starosti.

Upozorenje:

Ne dodirivati kapaljkom oko. Poslije uporabe bočicu dobro zatvoriti. Nakon prvog otvaranja bočice, kapi se smiju rabiti 30 dana.

Interakcije:

Istovremena primjena tricikličkih antidepresiva i nafazolina može pojačati konstriktorski učinak nafazolina.

Trudnoća i dojenje:

Zbog nedostatnih podataka kapi treba oprezno koristiti za vrijeme trudnoće i dojenja.

Kontraindikacije:

Kapi ne smiju primjenjivati osobe preosjetljive na bilo koji sastojak pripravka te bolesnici s glaukomom zatvorenog kuta, erozijom i ulkusom rožnice oka.

Nuspojave:

Nuspojave nafazolina primijenjenog u terapijskim dozama su vrlo rijetke. Primjena u visokim dozama, te dugotrajna i česta primjena može izazvati pojavu iritacije, povećanog crvenila oka, midrijazu, povećanja ili sniženja očnog tlaka. Vrlo rijetko mogu se pojaviti sustavne nuspojave kao glavobolja, hipertenzija, mučnina, pospanost, pojačano znojenje te nepravilnost rada srca. O svakoj nuspojavi treba obavijestiti liječnika ili ljekarnika!

Način čuvanja:

Čuvati pri temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svjetlosti.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakovanje:

10 mL otopine.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakovanju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
GALENSKI LABORATORIJ
Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute/ revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr