

## Alofran tablete za čišćenje

---

### Sastav:

1 tableta sadržava 220 mg suhog ekstrakta krkavinine kore, normiranog (Frangulae corticis extractum siccum normatum), 20 mg alojevog suhog ekstrakta, normiranog (Aloes extractum siccum normatum), 20 mg suhog ekstrakta seninog lista, normiranog (Sennae folii extractum siccum normatum) što odgovara najmanje 18 mg ukupnih hidroksiantracenskih derivata izraženo kao glukofrangulin A (Mr 578,5).

### Pomoćne tvari:

Suhi ekstrakt sladića, celuloza mikrokristalična, krosповidon, silicijev dioksid koloidni bezvodni, magnezijev stearat, talk.

### Djelovanje i indikacije:

Tablete su kombinacija laksativnih tvari prirodnog podrijetla koje pretežno djeluju u debelom crijevu. Suhi ekstrakt krkavinine kore sadržava hidroksiantracenske derivate koji podražuju sluznicu debelog crijeva. Na taj način se povećava izlučivanje sluzi, ubrzava peristaltika crijeva i pojačava refleks defekacije. Alojev suhi ekstrakt sadržava hidroksiantracenske derivate koji djeluju hiperemički u debelom crijevu pobuđujući neuromuskularni mehanizam peristaltičkog transporta sadržaja.

Senozidi A i B su glikozidi seninog lišća, koji doprinose nakupljanju tekućine u debelom crijevu, uz izražen laksativni učinak.

Tablete se rabe kod opstipacije, naročito kronične, uzrokovane promjenom prehrane, stresom ili smanjenim kretanjem; kod pripreme crijeva za rendgenske pretrage, pretrage urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta, hemoroida i sl.

### Doziranje i način primjene:

Po potrebi 1 do 4 tablete popiti uz najmanje dvije čaše vode.

Laksativni učinak se javlja 8 – 10 sati nakon uzimanja tableta.

### MJERE OPREZA

#### Upozorenje:

Redovitost u pražnjenju crijeva može varirati bez ikakvih štetnih posljedica te ne treba odmah pribjeći uporabi laksativnog sredstva.

Prije primjene Alofran tableta savjetujte se s liječnikom ako imate neku od kroničnih bolesti, metabolički poremećaj, ako ste alergični ili uzimate još neke lijekove.

Dugotrajna primjena stimulatornih laksativa može dovesti do laksativne ovisnosti i gubitka normalne funkcije crijeva. Savjetujte se s liječnikom ako tijekom uporabe laksativnog sredstva dođe do iznenadne promjene u probavi ili ako kroz 7 dana primjene lijeka nema laksativnog učinka. Ne preporučuje se primjena lijeka duža od 10 dana.

### **Interakcije:**

Ubrzani prolaz sadržaja kroz crijeva može smanjiti apsorpciju određenih lijekova koji su istodobno primijenjeni na usta. Hidroksiantracenski derivati mogu poremetiti dijagnostičke testove i dovesti do lažno pozitivnog nalaza urobilinogena i estrogena u mokraći. Pri dugotrajnoj uporabi laksativa može doći do gubitka vode i elektrolita, prvenstveno kalija, što može pojačati učinak kardiotoničnih glikozida i antiaritmika.

Ako istovremeno koristite lijekove koji mogu dovesti do hipokalijemije (diuretici, kortikosteroidi), može se poremetiti elektrolitska ravnoteža.

### **Trudnoća i dojenje:**

Ne preporučuje se primjena u trudnica i dojilja zbog mogućnosti pojave grčeva.

### **Kontraindikacije:**

Preosjetljivost na bilo koji sastojak Alofran tableta, abdominalni bolovi nepoznatog uzroka, upala slijepog crijeva, upalne bolesti debelog crijeva (npr. Chronova bolest, ulcerozni kolitis), atonija crijeva, zapletaj debelog crijeva (ileus), proljev, dehidracija, slabost i povraćanje.

Alofran tablete se ne smiju davati djeci mlađoj od 12 godina.

### **Nuspojave:**

Pri kratkotrajnoj primjeni nuspojave se rijetko javljaju. Može se javiti nelagoda u debelom crijevu, grčevite boli, mučnina i lokalni nadražaj, promjena boje mokraće u žutu pri kiselom pH, te crvenu pri alkalnom pH.

Pri dugotrajnoj primjeni mogu se javiti lijena crijeva, proljev uz gubitak vode i elektrolita, prvenstveno kalija. Može doći do promjene boje sluznice debelog crijeva.

### **Način čuvanja:**

Čuvati na suhu mjestu pri temperaturi do 25°C.

### **Način izdavanja:**

Izdaje se bez liječničkog recepta.

### **Pakovanje:**

20 tableta (2x10) u blister pakovanju, u kutiji.

### **Rok valjanosti:**

Otisnut na pakovanju.

**Galenski pripravak izradila:**

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute/ revizija upute, veljača 2019.

**ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!**

[www.gljz.hr](http://www.gljz.hr)