

Heparin-Na-50 000 I.U. gel

Sastav:

1g gela sadržava 500 I.U. heparinnatrija; 5 mg dekspantenola; 2,5 mg alantoina; 5 mg eteričnog ulja bora.

Pomoćne tvari:

Voda, pročišćena; izopropilni alkohol; razrijeđeni amonijak; poliakrilna kiselina; makrogolglicerolhidroksistearat.

Djelovanje i indikacije:

Heparinnatrij nakon resorpcije sprječava zgrušavanje krvi i tako djeluje preventivno i terapijski na nastajanje tromba, odnosno na već nastale trombe u krvnim žilama. Dekspantenol omekšava kožu, smanjuje nadraženost kože i pospješuje njezino obnavljanje. Alantoin potpomaže granulaciju tkiva i ubrzava cijeljenje rana. Eterično ulje bora ublažava bol, smanjuje grčeve, a uz to djeluje i kao blagi antiseptik. Gel rabimo kod flebitisa, površinskog tromboflebitisa, bolnih vena (bol i grčevi u listovima nogu), sportskih povreda (hematoma, kontuzije, distorzije, uganuća), poboljšanja stanja postoperativnih ožiljaka.

Doziranje i način primjene:

Ako liječnik ne odredi drugačije, 2-4 puta dnevno nanijeti gel u tankom sloju uz blago utrljavanje, kroz dva do tri tjedna.

MJERE OPREZA

Upozorenje:

Paziti da ne dođe u oči, na sluznicu i otvorene rane.

Interakcije:

Nisu nam poznate.

Trudnoća i dojenje:

Prije uporabe potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Kontraindikacije:

Preosjetljivost na bilo koji sastojak pripravka. Ulcus cruris koji krvari, druga krvarenja, inficirane površine.

Nuspojave:

Rijetko se javljaju alergijske reakcije na sastojke gela.

Način čuvanja:

Čuvati dobro zatvoreno pri temperaturi do 25 °C.

Način izdavanja:

Izdaje se bez liječničkog recepta.

Pakovanje:

Tube po 50 g gela.

Rok valjanosti:

Otisnut na pakovanju.

Galenski pripravak izradila:

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

GALENSKI LABORATORIJ

Buzin, Bani 98, 10 010 Zagreb

Datum upute/ revizija upute, veljača 2019.

ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

www.gljz.hr